

新冠肺炎疫苗接种者须知






～接种后(特别刚打完疫苗到之后的几天时间)请注意身体状况～

接种后，请在接种会场静坐15分钟以上，观察一下身体状况。

有可能会出现的症状

日本现在使用的疫苗因为是肌肉注射，会频繁出现疼痛或者肿胀等轻微的副作用。但通常在几天内就能治愈。有必要时可以服用解热镇痛剂等，暂时观察身体状况。
(出现影响到日常生活的严重症状的比例非常小。)

【症状的出现状况】

症状							
	疼痛	肿	腹泻	肌肉疼 关节疼	头疼	疲劳	发冷

日本现在使用的疫苗需要接种两次。已证实这些副作用中的多数症状在第二次打疫苗时出现的频率会比第一次打疫苗时高。另外也证实非老年人出现症状的频率会比老年人高。产生副作用是免疫功能的反应，也可以说是证明有了免疫功能。

如果上述症状一直持续，或者身体状况不同以往或出现异常情况，请及时向自己接受疫苗的医疗机关或者平常就诊的医院，或者栃木县的专门咨询窗口咨询。
如果出现剧烈疼痛、肿胀或高烧等严重症状时，请及时到医疗机关就诊。

问讯

公益财团法人 栃木县国际交流协会 Tochigi International Association ☎028-621-0777

有可能出现的严重症状

【症状的出现状况、时间】

■ 打完疫苗后，偶尔有时会在5分钟以内、通常在30分钟内出现以下的症状的话，有可能是产生了休克、过敏反应症。

(过敏反应症发生比例：接种疫苗每100万例中出现11.1例)



·皮肤瘙痒
·荨麻疹
·红斑
·皮肤发红
等



·腹痛、恶心
等



·视觉异常



·声音沙哑
·打喷嚏
·喉咙发痒
·呼吸困难
等



·脸色苍白
·意识不清
等

接种后，请在会场等候一段时间，观察身体状况。如出现此类症状请立即联系接种会场的医生或护士等人员。

■ 万一从接种会场回家后，如果出现上述症状，请向栃木县设置的24小时服务的专门咨询窗口咨询。

出现严重症状时

为居住在栃木县的外国人的「新型冠状病毒咨询专线」

☎ 028-678-8282

24小时 可对应周六、周日、节假日 ※ 20语言



详情·最新信息
请点击此处
(栃木县HP)

问讯

公益财团法人 栃木县国际交流协会 Tochigi International Association ☎028-621-0777

此文是由国际交流协会网络大阪在埼玉县的协助下，作为提供多种语言信息的一环而制作的。